

指示基準

	乳児(満1歳まで)	幼児(就学前まで)	学童(6～12歳)
バイタルサイン	T:36.3～37.5℃ (38.5℃以上にならないように) HR:100～120回 R:30～45回	T:36.5～37.4℃ (38.5℃以上にならないように) HR:90～110回 R:25～30回	T:36.5～37.1℃ (38.5℃以上にならないように) HR:70～90回 R:20～25回
呼吸	<ul style="list-style-type: none"> ・SpO2:94%以下にならない ・異常呼吸や努力様の呼吸がみられない ・末梢冷感、チアノーゼがみられない 		
尿量 (6時間以上排尿が みられないときは 報告)	1日の排泄回数10～16回(病児保育 中8時間内に3～5回はオムツに排泄 がある)	1,2歳:1日の排泄回数7～12回(病児 保育中8時間内に2～4回はオムツ またはトイレで排泄がある)	1日の排泄回数7,8回(病児保育中 8時間内に2,3回はトイレにて排泄が ある)
	3歳以上:1日の排泄回数5～8回 (病児保育中8時間内に2～3回はトイレにて排泄がある)		
水分摂取量	1日の維持水分量がとれる 3～10kg:100ml×体重【1日の必要水分量:300ml～1000ml】病児保育内8時間では、 1時間に約40～50mlを目安として摂取できる 11～20kg:1000ml+50ml×(体重-10)【1日の必要水分量:1050ml～1550ml】病児保育内8時間では、 1時間に約60～70mlを目安として摂取できる 20kg以上:1500ml+20ml×(体重-20)【1日の必要水分量:1550ml～】病児保育内8時間では、 1時間に約60～70mlを目安として摂取できる		
活気・機嫌	機嫌が悪い、ぼーっとしている、横になっても眠れない、遊ばずにじっとしていることが多い、なんだか様子がおかしいなどのエピソードがみられない		
下痢・嘔吐	血液、粘液便がある、イチゴジャムのような便がある。我慢できない持続する腹痛がありお腹が張っている、お腹が痛くて歩けない、吐いたものに血液や緑色の胆汁が混ざっているなどのエピソードがみられない		
皮膚粘膜の状態	泣いても涙がでない、口腔内・口唇の乾燥、皮膚の張りの低下などのエピソードがみられない		

※T:体温 HR:脈拍数 R:呼吸数 SpO2:経皮的動脈血酸素飽和度